

Bij FLEXcombo draait het om



VERS
GEMENGD
KLASSE
BESCHERMD




Vers gemengd

Veiligheid

Vaccineren zorgt dat een dier goed is voorbereid op de echte ziekteverwekker later in het leven. Een ideaal vaccin heeft minimale negatieve impact direct na vaccinatie en maximale bescherming tegen ziekteverwekkers. Een slecht scenario is dat dieren na vaccinatie enkele dagen minder presteren, zich slecht voelen door entreacties en minder voer kunnen opnemen.

Bijgaand een studie¹ naar voeropname na vaccinatie met MycoFLEX en een op minerale olie gebaseerd vaccin B. De biggen gevaccineerd met vaccin B nemen 170 gram minder voer op. Een dip veroorzaakt door de ent-reactie.

Voeropname eerste 24 uur na vaccinatie.



FLEX vaccins onderscheiden zich met een gunstig veiligheidsprofiel^{1,2,3,4}


klasse beschermd

Uiteindelijk draait het om euro's!


Zekerheid

Het vertrouwen in FLEXcombo wordt bevestigd door de positieve ervaringen van varkenshouders die het product al jaren inzetten. Ook in 2014 zijn CircoFLEX en MycoFLEX, vers gemengd als FLEXcombo, het meest gekozen door varkenshouders en dierenartsen⁵. Niet voor niets, want al jaren kiest de meerderheid voor effectiviteit, zekerheid én veiligheid.

Marktaandelen Mycoplasma vaccins



Marktaandelen Circo vaccins



Effectiviteit

In deze Nederlandse studie⁶ zorgt het vers mengen van MycoFLEX en CircoFLEX voor betere technische resultaten en een duidelijk beter beeld in de stal.

Technische resultaten van de vleesvarkens voor en na het inzetten van MycoFLEX in de FLEXcombo.

	CircoFLEX	CircoFLEX en MycoFLEX	Verskil	Extra Opbrengst
GROEI (GRAM PER DAG)	755	775	+20	€ 2,91
VOEDER CONVERSIE	2,8	2,71	-0,09	
STERFTE (0%)	2,6	1,9	-0,7	
SPIERDIKTE (MM)	61,95	66,22	+4,27	
SPEKDIKTE (MM)	16,41	15,89	-0,53	

FLEXcombo zorgt voor verbeterde prestaties en een hogere opbrengst.

In onderstaande studie⁷ wordt het vers gemengd vaccin FLEXcombo (1 x 2ml) van Boehringer Ingelheim vergeleken met het voorgemengd vaccin Circumvent PCVM (2 x 2ml) van MSD. De hogere groei in de FLEXcombo groep zorgt voor een hoger slachtgewicht. Daarnaast blijven er minder rest varkens achter. Met het vers gemengde FLEXcombo doet u geen concessie aan de effectiviteit.

Technische resultaten van twee gecombineerde Circo, Mycoplasma vaccinatie protocollen.

	Controle	BI FLEXcombo	Kant en klaar combinatie vaccin
Aantal	292	1024	1022
Gem. gewicht (kg) D 21	4,91	4,99	4,99
Gem. gewicht (kg) slacht	121,3 ^b	124,1 ^a	122,8 ^b
Gemiddelde Groei (kg/d)	0,758 ^b	0,780 ^a	0,767 ^b
Ligdagen	154,4 ^a	153,3 ^b	153,8 ^{ab}
Sterfte (%)	3,46 ^d	1,27 ^e	1,47 ^e
Rest varkens (%)	4,60 ^d	1,67 ^e	3,33 ^d

a, b: gemiddelde verschillen (Turkey's HSD) $p \leq 0,05$ d, e: gemiddelde verschillen (Fisher's Exact test) $p \leq 0,05$

Vers gemengd = Géén concessies aan effectiviteit!

De meest gekozen, is ook het meest geliefd!

¹ Baumert, IPVS 2008

² Bak, Emerging diseases 2011

³ Johnson, AASV 2013

⁴ Miyashita, IPVS 2014

⁵ Agridirect Hokdierscanner 2010 t/m 2014

⁶ Struik et al., IPVS 2014

⁷ Payne et al., IPVS 2012

Ingelvac MycoFLEX[®] susp. voor inj. voor varkens. Werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd mycoplasma hyopneumoniae, J-stam isolaat B-3745, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 3 wk ter vermindering van longlaesies als gevolg van infectie met m.hyo. Bescherming begint vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt ten minste 26 wk aan. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Bijwerkingen zijn zeldzaam: een voorbijgaande zwelling met een diameter tot 4 cm, soms samengaand met roodheid van de huid, kan worden waargenomen op de plek van injectie. Deze zwelling kan tot 5 dagen aanhouden. Een voorbijgaande gemiddelde toename van de rectale lichaamstemperatuur van ongeveer 0,8°C kan tot 20u na vaccinatie worden waargenomen. Dosering: Enkelvoudige i.m. injectie van 1 dosis (1 ml). Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac CircoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac CircoFLEX dienen alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed schudden voor gebruik. Wachtijd: (Orgaan)vlees: 0 dg. REG NL 104086 UDD. Ingelvac CircoFLEX[®] susp. voor inj. voor varkens. Elke dosis geïnactiveerd vaccin bevat: PCV2 ORF2 eiwit, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 2 wk tegen PCV2 om de sterfte, klinische verschijnselen - inclusief gewichtsverlies - en letsels in lymfatisch weefsel geassocieerd met PCV2 gerelateerde aandoeningen (PCVD) te verminderen. Tevens is bewezen dat vaccinatie de nasale verspreiding van PCV2, de virus load in het bloed en lymfatisch weefsel, en de duur van de viraemie vermindert. Bescherming begint al vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt minstens 17 wk aan. Contra-indicaties: Geen bekend. Bijwerkingen: Een voorbijgaande zenuw milde hyperthermie op de dag van vaccinatie treedt erg vaak op. Dosering: Enkelvoudige i.m. inj. van 1 dosis (1 ml), ongeacht het lichaamsgewicht. Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac MycoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX dienen alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed schudden voor gebruik. Wachtijd: 0 dagen. REG NL 102672 UDD. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Boehringer Ingelheim bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, telefoon: +31 (0)72 566 24 11